

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne Démocratique et Populaire



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
Université de Constantine 3 Salah Bounider  
FACULTE DE MEDECINE



**DEPARTEMENT DE MEDECINE DENTAIRE**

**MEMOIRE DE FIN D'ÉTUDES POUR  
L'OBTENTION DU DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE DENTAIRE**

**Thème :**

**LA DYSHARMONIE DENTO-MAXILLAIRE :  
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT**

**Présenté par :**

**ARAAR Rofia**

**BAHLOUL Amira Ines**

**HAFSAOUI Khadidja**

**MEZLAH Amine**

**NADJI Rania**

**AYADA Housseem Eddine**

**BRAKNI Hamza**

**HAMICHE Amira**

**MOUSSOUS Zeyneb Riyane Ichraq**

**SALHI Nesrine**

**Encadré par :**

**Dr. A. MERBOUHI**

Soutenu publiquement le **15.07.2021** devant le jury :

**Dr. F. MERABET** Maitre-Assistant en orthopédie dento faciale

Président

**Dr. MOULAI** Professeur en orthopédie dento faciale

Examineur

**Dr. A. MERBOUHI** Maitre-Assistant en orthopédie dento faciale

Encadrant

**Année universitaire 2020-2021**

## **Conclusion :**

La DDM est un problème qui constitue un motif de consultation croissant chez le chirurgien-dentiste surtout pour son préjudice esthétique et ses conséquences fonctionnelles qui passent inaperçus au début pour les patients en vue de son évolution lente et de certains signes discrets c'est pour cela qu'une visite précoce et routinière chez l'orthodontiste est nécessaire pour déceler cette anomalie, et bien accompagner son patient en l'informant ainsi que ses parents, en conseillant et en lui proposant des solutions pour prévenir l'aggravation de l'anomalie et préparer le terrain pour pouvoir intervenir ultérieurement dans les meilleures conditions.

Le plan thérapeutique doit être global et complet puisque la dysharmonie dento-maxillaire n'est presque jamais isolée mais souvent associée à d'autres anomalies, le choix thérapeutique doit être expliqué et justifié par le dossier orthodontique et surtout la décision d'extraire ou non, de le faire précocement ou tardivement qui est considérée comme un sujet de discussion chez les orthodontistes. Le traitement précoce limitera les risques de récurrence et diminuerait la durée du traitement orthodontique.

D'après C.Gugino : « Plus le traitement est précoce, plus la face s'adapte à votre concept, plus le traitement est tardif et plus votre concept doit s'adapter à la face »