

Plan de travail :

| | |
|---|----|
| 1. Introduction. | 01 |
| 2. Partie théorique | 02 |
| 2.1. Rappels et généralités | 02 |
| 2.1.1. Rappel anatomique | 02 |
| 2.1.1.1. L'os maxillaire | 02 |
| 2.1.1.2. La région palatine | 06 |
| 2.1.1.3. Les cavités sinusiennes | 08 |
| 2.1.1.4. La cavité nasale | 09 |
| 2.1.1.5. La vascularisation et l'innervation de la région maxillo-faciale ... | 10 |
| 2.1.1.6. Les muscles | 12 |
| 2.1.2. Les étiologies de la perte de substance | 12 |
| 2.1.2.1. Cancérologie | 12 |
| 2.1.2.1.1. Les étiologies de tumeurs | 12 |
| 2.1.2.1.2. Les lésions précancéreuses | 14 |
| 2.1.2.1.3. Les tumeurs de la cavité buccale | 15 |
| 2.1.2.1.3.1. Les tumeurs bénignes | 16 |
| 2.1.2.1.3.2. Les tumeurs malignes | 17 |
| 2.1.2.1.4. Les modalités thérapeutique | 20 |
| 2.1.2.1.4.1. La radiothérapie | 20 |
| 2.1.2.1.4.2. La chimiothérapie | 21 |
| 2.1.2.1.4.3. L'exérèse chirurgicale | 21 |
| 2.1.2.2. Les pertes de substance maxillaires congénitales | 24 |
| 2.1.2.2.1. Les fentes labio-alvéolo-palatines | 24 |
| 2.1.2.2.1.1. Fente antérieures du palais primaire | 24 |
| 2.1.2.2.1.2. Fente palatine isolée | 25 |
| 2.1.2.2.1.3. Fente vélo- palatine | 27 |
| 2.1.2.2.1.4. Fente labio-maxillo-palatine | 26 |
| 2.1.2.2.2. Les syndromes | 27 |
| 2.1.2.2.2.1. Syndrome de Pierre Robin | 27 |
| 2.1.2.2.2.2. Syndrome de Treacher-Collins | 28 |
| 2.1.2.2.2.3. Syndrome de Van Der Woud | 28 |
| 2.1.2.2.2.4. Syndrome EEC | 28 |
| 2.1.2.3. Traumatologie | 29 |
| 2.1.2.3.1. La fréquence | 29 |
| 2.1.2.3.2. Les causes | 29 |
| 2.1.2.4. Infectieuses | 30 |
| 2.1.2.5. Iatrogènes | 31 |
| 2.1.2.5.1. L'extraction | 31 |