

RESUME :

Les restaurations prothétiques sur implants chez les patients présentent un endentement partiel au niveau de secteur antérieur, requièrent une connaissance précise de cette région anatomique de la part de praticien. De plus, l'implantologiste devra pratiquer avant toute décision thérapeutique : un examen clinique minutieux et toute une série d'examens complémentaires tels que radiographies, moulage en plâtre ou photographies.

Pour un résultat optimal, le praticien devra passer par des étapes chirurgicales précédentes ou concomitantes à la pose des implants. Ainsi, il pourra positionner au mieux les implants sur les crêtes alvéolaires résiduelles avant de mettre en place la prothèse provisoire qui jouera un rôle très important dans la cicatrisation esthétique de site opéré. De plus, une autre étape chirurgicale d'aménagement des tissus mous péri-implantaires permettra d'améliorer davantage l'esthétique de la restauration implanto-portée.

La pérennité des implants, pour le patient, réside principalement sur les séances de maintenance chez le dentiste praticien et sur une hygiène quotidienne rigoureuse.

ABSTRACT :

The prosthetic restorations on implants to patients who are partially edentulous on the anterior sector require a well precised anatomical knowledge of this area from the part of the implantologist. Moreover the practitioner must execute thoughtfully a clinical examination along with a completed serie of all the complementary exams : radiological, casting with plaster or photography.

For an optimal aesthetic result, the practitioner should often pass by different surgical steps which precede or accompany the pose of the implant such as bone grafting. Also, he is required to place the implants on their spots on the alveolar crest correctly before placing the temporary prosthetis which has a great impact on the esthetic cicatrisation of the wounded site. In addition, another surgical step of adjusting the soft tissues peri-implantitis will also improve the esthetic aspect of the prosthetic restoration on implants.

The sustainability of the quality of the implants, for the patient, resides mainly on the regulair maintenance visits to the dentist along with an efficeint hygiene.

: ملخص

تتطلب الترميمات التعويضية على الغرسات في المرضى الذين يعانون من أسنان جزئية في القطاع الأمامي معرفة دقيقة لهذه المنطقة التشريحية من جانب الممارس. بالإضافة إلى ذلك ، سيتعين على أخصائي علم الأمراض أن يتدرب قبل أو أي قرار علاجي: فحص سريري دقيق وسلسلة كاملة من الفحوصات التكميلية مثل الأشعة السينية ، القوالب الجبسية الصور.

للحصول على نتيجة مثالية ، يجب على الممارس أن يمر بخطوات جراحية سابقة أو مصاحبة لوضع الغرسات. وبالتالي ، يمكنه وضع الغرسات بشكل أفضل على الحواف السخية المتبقية قبل تركيب الطرف الاصطناعي المؤقت الذي سيلعب دورًا مهمًا للغاية في الشفاء الجمالي لموقع العملية. بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل خطوة جراحية أخرى لتطوير الأنسجة الرخوة شبه المزروعة على تحسين جماليات الترميم المدعوم بالزرع تكمن متانة الزرع ، بالنسبة للمريض ، بشكل أساسي في جلسات الصيانة مع طبيب الأسنان الممارس وفي النظافة اليومية الصارمة.