

Université Mentouri
Constantine
Faculté de médecine



DEPARTEMENT DE CHIRURGIE DENTAIRE
SERVICE D'ORTHOPEDIE
DENTO-FACIAL

MCD/2608

Mémoire de fin d'Etudes en vue de l'obtention du
diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire.

*L'articulé croisé antérieur
Attitude préventive et
interceptive*

Réalisé par:

Lahoulou Bouchra
Kiniouar Safia
Khoudja Keltoum
Khelfaoui wided
Khaldi Nour El Houda
Medfouni Souhila

Encadré par: DR.Koua

Promotion: 2012-2013

Sommaire

Introduction

I. Rappels

- théorie explicative
- croissance de la base du crane
- croissance du maxillaire dans le sens sagittal
- croissance de la mandibule
- types faciaux :
 - *hypo divergent
 - *hyper divergent
 - *normo divergent

II. Interret clinique des rappels

III. Les fonctions et leurs influence sur la croissance des bases maxillaires

- ventilation
- mastication
- position linguale

IV. Les para fonctions et leurs influence sur la croissance des bases

V. Les caractéristiques de l'anomalie

VI. Attitude thérapeutique

- définition: - de la prévention
 - de l'interception
- importance du dépistage précoce
- importance du TRT interceptif précoce.
- attitude préventive
- attitude interceptive :
 - *objectifs du TRT interceptif
 - *traitement mécanique
 - *traitement fonctionnel

Conclusion.

Conclusion

L'orthopédie préventive et interceptive représente l'ensemble des mesures qui permettent d'éviter l'apparition, l'aggravation et l'extension d'une dysmorphose.

Elle doit être une démarche habituelle en Orthopédie Dento-Faciale, en particulier chez le jeune enfant, tant pour le praticien généraliste que pour le spécialiste.

Elle correspond à l'évolution globale de l'exercice de la chirurgie dentaire qui doit pratiquer une dentisterie préventive et curative. Elle passe par un dépistage des anomalies orthodontiques en denture temporaire et en denture mixte et une sélection des cas pour lesquels une telle approche se justifie.

S'il est difficile d'appliquer ces notions aux anomalies héréditaires et congénitales il reste par contre possible d'agir sur les anomalies acquises en essayant de les détecter dès le plus jeune âge afin de les supprimer car leur persistance provoquent des déséquilibres structuraux avec des répercussions plus ou moins sévères sur la croissance faciale et sur l'équilibre de la sphère orofaciale.